

## Dermapen4（ダーマペン4）治療同意書

ダーマペン4はEquipmed社（オーストラリア）が開発した医療機器です。極細心針の長さや速度を電動でコントロールし皮膚に微細な穴を無数に開けることで皮膚の創傷治療効果（修復機能）を高め、コラーゲンやエラスチンなどの増生を促し、肌質や瘢痕を改善させていく治療に使用します。

### 1. ダーマペンで得られる効果

にきび跡、肌の張りやキメ、毛穴の開き、小じわ、毛孔性苔癬、リフティング効果など（個人差あり）

### 2. 治療のながれ

洗顔後、表面麻酔クリームを塗布します。（15分程度で効果が表れます）その後、治療目的に応じた薬剤を用いて治療を開始します。

### 3. 使用する薬剤

治療目的に応じて使いわけます。治療効果は患者様のお肌の状態により異なります。治療効果を得るには適切な治療回数（通常3～5回 月に1回ペース）が必要になります。（医師と相談）

### 4. 針

医療用の極細針（33G×16本）を用いて穿刺します。針の長さにより皮膚に赤みが生じたり、出血することがあります。

### 5. 治療後の経過

治療直後に鎮静のパックをします。

治療の程度により、赤み、内出血、腫れやヒリつきが生じることがありますが、ほとんどの場合、数日で消失します。長い方でも1週間程度で消失します。

### 6. 治療後の注意点

治療後12時間はメイクや洗顔をしないでください。洗髪も顔が濡れないようにして頂きたいので12時間後をお願い致します。（針の長さによっては、翌日から可能 医師と相談）。感染を防ぐため、治療部位は可能な限り清潔にしてください。

### 7. 日焼け止め

治療当日は、市販の日焼け止めは使用できません。（含有成分が穿刺箇所に入り込み、副作用を生じる可能性があるため）

### 8. 以下の方は、治療をお受けできません。（医師の判断が必要）

妊娠中・授乳中・嚢胞性酒さ・滲出を伴う重度の尋常性ざ瘡・いぼ・ヘルペス・強皮症・日光性角化症  
皮膚がん・血友病・鉄アレルギー

（2週間以内にハイドロキノン・トレチノインを使用した方・ピーリング効果のある外用薬＜ディフェリン・ベピオゲル・エピデュオゲルなど＞を3日前まで使用していた方）

※使用する消毒、麻酔や薬剤にアレルギーのある方は事前にお申し出ください。

### 9. 肝斑の症状がある場合、針の長さによっては濃くなる可能性があります。

